加速化過酸化水素 除菌剤　Optim33　接触時間表

対象となる細菌及びウイルス	効果	接触時間
緑膿菌	有効	1 分
黄色ブドウ球菌	有効	1 分
豚コレラ菌、サルモネラ腸炎菌	有効	1 分
大腸菌 0157	有効	1 分
肺炎桿菌	有効	1 分
メシチリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）	有効	1 分
パンコマイシン耐性腸球菌（VRE）	有効	1 分
大腸菌	有効	1 分
アシネトバクター　バウマニ—	有効	1 分
志賀（赤痢）菌	有効	1 分
リステリア菌	有効	1 分
HIV 1型　菌種 HTLV Ⅲ	有効	1 分
単純ヘルペス 1型	有効	1 分
単純ヘルペス 2型	有効	1 分
ヒトコロナウイルス	有効	1 分
インフルエンザA VR-544, 香港菌種	有効	1 分
鳥インフルエンザ A (H3N2)	有効	1 分
B型肝炎ウイルス (HBV)	有効	1 分
C型肝炎ウイルス (HBV)	有効	1 分
ノロウイルス	有効	1 分
猫科カリシウイルス	有効	1 分
ライノウイルス	有効	1 分
ポリオ1型、菌種Brunhilde	有効	1 分
アデノウイルス 8型	有効	1 分
ロタウイルス WA	有効	1 分
ウシ（型）結核菌	有効	5 分

＊接触時間は公的に利用可能な資料から得たもので、表の作成時点では有効なものです。
申告内容に変更があれば、更新いたします。

＊データ提供元：　Scican株式会社　カナダ
＊日本語版編集：　㈱未来ゲート　2015年1月